

3.0kcal/ml

「日本人の食事摂取基準(2015年版)」
を参考にしております。

業界最高濃度[※] 3.0kcal/mlを実現

※当社調べ(2016年4月現在)

メディエフ プッシュケア[®] 2.5

半固形 低粘度タイプ

少量
高エネルギー
(3.0kcal/ml)

食物繊維・
オリゴ糖配合

ナトリウム
高配合



300kcal/120g



400kcal/160g



NestléHealthScience

業界最高濃度^{※1} 3.0kcal/mlを実現し、
短時間で衛生的な栄養管理をサポートします。

メディエフ プッシュケア[®] 2.5

半固形 低粘度タイプ




※1: 当社調べ (2016年4月現在)

“メディエフ プッシュケア 2.5”の特徴

少量高エネルギー (3.0kcal/ml)

- 1.0kcal/ml 製品の1/3の量で
同熱量供給可能
- 摂取時間の短縮
- 逆流性誤嚥への配慮
(胃のボリュームが小さな高齢者に)



食物繊維・オリゴ糖

- ガラクトマンナンおよび難消化性デキストリンを配合 (食物繊維 1.2g/100kcal)
- オリゴ糖配合


MCT^{※2} (中鎖脂肪酸 トリグリセリド)

- 速やかな消化吸収 (LCTの3~4倍)
- 速やかなエネルギーの補給による、たんぱく質の節約効果

※2: 中鎖脂肪酸トリグリセリド (MCT): 長鎖脂肪酸トリグリセリド (LCT) と異なる消化吸収過程から、LCT に比べ 3~4 倍速く消化吸収されて肝臓で速やかにエネルギーとなるため、体内蓄積率の低い脂肪として知られており、臨床でも幅広く利用されています。脂肪組織内への貯蔵率は 1% 以下です^{※3}。

※3: 岩佐幹恵、岩佐正人、小越草平、MCT 乳剤について JJPEN.10 (2) 113-117 (1988)

■ 消化吸収過程




ビタミン・ミネラル

- 1日900kcalの摂取で、「日本人の食事摂取基準 (2015年版)」^{※4}の
主要なビタミン・微量元素を補給^{※5}
- ナトリウム配合 (食塩相当量 4.6g/900kcal)

※4: 「日本人の食事摂取基準 (2015年版)」70歳以上男性、女性

※5: Fe、Zn、Cu、Mn、Cr、Mo、I、V.A、V.E、V.B1、V.B2、ナイアシン、V.B6、V.B12、葉酸、パントテン酸、ピオチン、V.C

“メディエフ プッシュケア 2.5”の3大栄養素エネルギー比



栄養成分表

メディエフ プッシュケア 2.5の量			100kcal (40g)	300kcal (120g)	400kcal (160g)	800kcal (320g)	900kcal (360g)	
熱量			kcal	100	300	400	800	900
たんぱく質			g	4.7	14.1	18.8	37.6	42.3
(含遊離グルタミン酸)			(g)	(0.2)	(0.5)	(0.7)	(1.3)	(1.5)
脂質			g	2.8	8.4	11.2	22.4	25.2
炭水化物			g	14.0	42.0	56.0	112.0	126.0
糖質			g	12.8	38.4	51.2	102.4	115.2
オリゴ糖			g	0.1	0.3	0.4	0.8	0.9
食物繊維※6			g	1.2	3.6	4.8	9.6	10.8
ナトリウム			mg	200	600	800	1,600	1,800
(食塩相当量)			(g)	(0.51)	(1.52)	(2.03)	(4.05)	(4.56)
水分			ml	17	52	69	139	156
ミネラル		カリウム	mg	168	504	672	1,344	1,512
		カルシウム	mg	78	234	312	624	702
		マグネシウム	mg	33	99	132	264	297
		リン	mg	75	225	300	600	675
		鉄	mg	1.1	3.3	4.4	8.8	9.9
		亜鉛	mg	2.0	6.0	8.0	16.0	18.0
		銅	mg	0.13	0.40	0.53	1.07	1.20
		マンガン	mg	0.47	1.40	1.87	3.73	4.20
		ヨウ素	μg	17	51	68	136	153
		セレン	μg	3.3	9.9	13.2	26.4	29.7
		クロム	μg	3.3	9.9	13.2	26.4	29.7
		モリブデン	μg	2.8	8.4	11.2	22.4	25.2
		塩素	mg	200	600	800	1,600	1,800
ビタミン	脂溶性	ビタミン A	μgRE	89	267	356	712	801
		ビタミン D	μg	0.6	1.8	2.4	4.8	5.4
		ビタミン E	mg	0.8	2.4	3.2	6.4	7.2
		ビタミン K	μg	8	25	33	67	75
		ビタミン B ₁	mg	0.24	0.72	0.96	1.92	2.16
	水溶性	ビタミン B ₂	mg	0.20	0.60	0.80	1.60	1.80
		ナイアシン	mgNE※7	1.7	5.2	6.9	13.9	15.6
		ビタミン B ₆	mg	0.20	0.60	0.80	1.60	1.80
		ビタミン B ₁₂	μg	0.27	0.80	1.07	2.13	2.40
		葉酸	μg	27	80	107	213	240
		パントテン酸	mg	0.7	2.0	2.7	5.3	6.0
		ビオチン	μg	5.7	17.0	22.7	45.3	51.0
		ビタミン C	mg	30	90	120	240	270

：当社分析値（2016 年2月現在）

※6: 水溶性食物繊維の配合量を記載

※7: ナイアシン当量

主な原材料

デキストリン、乳たんぱく（乳成分を含む）、大豆たんぱく、食用植物油、水溶性食物繊維、中鎖脂肪酸トリグリセライド、精製魚油、オリゴ糖、酵母調製品、食塩、V.K₂ 含有食用油脂、酸味料、グルコン酸Na、乳化剤、クエン酸Na、塩化K、グルタミン酸Na、硫酸Mg、リン酸K、塩化Ca、酸化防止剤（イソアスコルビン酸Na）、香料、塩化Mg、V.C、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）、クエン酸鉄Na、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B₁、V.B₂、V.B₆、β-カロテン、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂

使用上の注意

- ◎本品は食品です。静脈内等には絶対に注入しないでください。
- ◎医師、栄養士の指導のもとにご使用ください。
- ◎使用中に異常が見られた場合は速やかに使用を中止し、医師、栄養士等にご相談ください。
- ◎他の食品、医薬品は混ぜないでご使用ください。
- ◎容器に漏れ、膨張、破損のみられるものは使用しないでください。
- ◎部分的に褐色になることや、水分が分離することがありますが、品質には問題ありません。
- ◎開封前に振ってご使用ください。
- ◎開封後は速やかにご使用ください。
- ◎通常は温めずにそのまま使用してください。冷たい場合、室温に戻してください。
- ◎容器のまま電子レンジで加熱しないでください。
- ◎本容器は使い捨て（ディスポーザブル）です。
- ◎本容器は落下・衝撃等により破損しやすいため、保管取り扱いには十分ご注意ください。
- ◎開栓時及び開栓後に容器を強くつかむと内容液が飛び出しますので、容器と飲用口のつなぎ目の固い部分を持って扱ってください。
- ◎本品のみで長期間の栄養管理を行う場合は、ビタミン、電解質、微量元素等のバランスや水分量にご注意ください。
- ◎乳、大豆由来の成分が含まれています。

取り扱い上の注意

- ◎性状に変化が見られる場合がありますので、凍結する場所や直射日光、高温の場所は避け、常温で保管してください。

基礎数値

メディアフ プッシュケア 2.5 (2.5kcal/g)	120g	160g
エネルギー (kcal)	300	400
水分量 (ml)	52	69
有効窒素量 (g)	2.3	3.0
NPC/N※1	110	
必須アミノ酸 / 全アミノ酸	0.48	
Fischer比	2.9	
電解質 (mEq/l)	Na ⁺ :265, K ⁺ :131, Ca ²⁺ :119, Mg ²⁺ :84, Cl ⁻ :171	
pH	3.8	

※1: 計算式から算出し、整数1の位を四捨五入

JANコード及び統一商品コード

	JANコード		統一商品コード
	製品	ケース	
120g	4 987788 050839	4 987788 510678	788 510678
160g	4 987788 050846	4 987788 510685	788 510685

包装及び賞味期間

包装：120g (300kcal)×24/ケース
160g (400kcal)×18/ケース
賞味期間：製造日より6ヶ月

半固形栄養食ラインナップ

アイソカルサポート ソフト
1.5kcal/ml
低粘度タイプ / PHGG 配合



アイソカル セミソリッド サポート
2.0kcal/ml
高粘度タイプ / PHGG 配合



メディアフ プッシュケア 2.5
3.0kcal/ml
低粘度タイプ



高カロリー

2016年4月発行